

**Funomid®**  
**Teriflunomida 14 mg**  
**Comprimidos**  
**Tarjeta de información para pacientes**

**Información importante para minimizar el riesgo de eventos adversos relacionados con Teriflunomida.**

Esta tarjeta contiene información de seguridad sobre su tratamiento con Teriflunomida, que es necesario que conozca. Para información adicional sobre este medicamento, puede consultar la Información para el Paciente, disponible en el envase o de manera online en el sitio web de Varifarma.

Es importante que lleve esta Tarjeta consigo en todo momento y se la muestre a cualquier médico o profesional de la Salud que lo atienda (por ejemplo, médicos de urgencias, su médico de atención primaria, etc.).

**EFFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO CON TERIFLUNOMIDA**

Contacte con su médico inmediatamente, si durante su tratamiento con Teriflunomida presenta:

- Piel o blanco de los ojos amarillos
- Dolor de estómago
- Náuseas, vómitos
- Temblores o escalofríos
- Tos
- Orina oscura, pequeñas cantidades o dolor al orinar
- Fiebre
- Cualquier otro efecto adverso que pueda presentar.

Además, periódicamente, se le realizarán análisis de sangre y se le medirá la presión arterial, ya que Teriflunomida puede:

- Afectar a su hígado, al número de las células de su sangre o a su sistema inmunitario.
- Aumentar su presión arterial o el riesgo de sufrir infecciones.

**INFORMACIÓN SOBRE EMBARAZO DIRIGIDO A MUJERES CON CAPACIDAD DE GESTACIÓN**

- Teriflunomida puede provocar daños graves en feto cuando se toma durante el embarazo.
- No comience el tratamiento con Teriflunomida si está embarazada o cree que podría estarlo.
- Informe a su médico si está planeando quedarse embarazada. Consulte con su médico si está en periodo

de lactancia.

- Utilice anticonceptivos eficaces durante y después de su tratamiento con Teriflunomida. Su médico le informará sobre las distintas posibilidades de métodos anticonceptivos existentes. • Contacte con su médico si desea cambiar de método anticonceptivo.
- Si queda embarazada o cree que puede estarlo, interrumpa el tratamiento con Teriflunomida y contacte con su médico inmediatamente.
- En caso de embarazo, su médico podría proponerle la administración de ciertos medicamentos para acelerar la eliminación de Teriflunomida de su organismo.
- Si es un padre, madre o tiene a su cargo una niña en tratamiento con Teriflunomida, debe contactar con el médico prescriptor que está haciendo seguimiento de su hija cuando su hija tenga la primera menstruación.

Nombre del paciente:.....

Fecha de la primera administración de Teriflunomida: .....

Nombre del médico-prescriptor:.....

Datos de contacto del médico-prescriptor: .....

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente al Laboratorio Varifarma a: [farmacovigilancia@varifarma.ec](mailto:farmacovigilancia@varifarma.ec)